

Manovre di disostruzione e di rianimazione pediatriche


(PER BAMBINI FINO A 12 ANNI DI ETÀ)

Lattante (da 0 a 1 anno)

Se l'ostruzione è parziale e il lattante è in grado di respirare, di tossire con forza e piangere:
non eseguire alcuna manovra

a cura di
Giovanna Greco
istruttrice del 118

OSTRUZIONE COMPLETA



1 Con il palmo della mano libera esegui 5 colpi sulla schiena tra le scapole (attenzione a non colpire il capo).

5 volte



2 Appoggia 2 dita della mano al centro del torace sulla linea che congiunge i capezzoli. Esegui 5 compressioni profonde circa 4 cm. Ripeti la sequenza di 5 colpi sulla schiena e 5 compressioni toraciche finché il corpo estraneo non esce o il lattante riprende a respirare o a piangere o finché non perde coscienza.


Attenzione!
Il rigurgito, i liquidi e i semiliquidi non sono corpi estranei e non vanno trattati con le manovre di disostruzione.

LATTANTE INCOSCIENTE CHE NON RESPIRA



3 Chiedi aiuto e fai allertare il 112; se non è presente nessuno, chiama personalmente. Se non è possibile, procedi subito con le manovre di rianimazione cardiopolmonare, iniziando con 30 compressioni toraciche (profonde circa 4 cm con un ritmo di 100-120 compressioni al minuto).

4 Effettua 2 ventilazioni bocca-bocca/naso della durata di un secondo mantenendo la testa in posizione neutra allineata con le spalle. Dopo due minuti di rianimazione cardiopolmonare, se qualcuno non lo ha già fatto, allerta personalmente il 112. Riprendi la rianimazione cardiopolmonare fino all'arrivo del soccorso sanitario di emergenza 112.




Manovre di disostruzione e di rianimazione pediatriche

(PER BAMBINI FINO A 12 ANNI DI ETÀ)

Bambino (oltre 1 anno di età)

Se l'ostruzione è parziale e il bambino è in grado di respirare, di tossire con forza e piangere:
non eseguire alcuna manovra

OSTRUZIONE COMPLETA



1 Collocati in piedi o inginocchiato dietro il bambino, circondagli i fianchi con entrambe le braccia. Con il pugno chiuso e l'altra mano che lo afferra sopra, effettua delle decise compressioni verso di te e verso l'alto sull'addome del bambino (manovra di Heimlich).

BAMBINO INCOSCIENTE CHE NON RESPIRA




2 Chiedi aiuto e fai allertare il 112; se non è presente nessuno, chiama personalmente il soccorso sanitario di emergenza. Se non è possibile, procedi subito con le manovre di rianimazione cardiopolmonare, iniziando con 30 compressioni toraciche (profonde circa 5 cm con un ritmo di 100 compressioni al minuto). Esegui con una o due mani, a seconda della grandezza del bambino.

3 Estendi il capo e solleva il mento. Chiudi con due dita le narici del bambino. Effettua 2 ventilazioni bocca-bocca della durata di 1 secondo.



2 volte



4 Dopo 2 minuti di rianimazione cardiopolmonare, se qualcuno non lo ha già fatto, allerta personalmente il 112. Riprendi la rianimazione cardiopolmonare fino all'arrivo del soccorso sanitario di emergenza.